



# COVID-19

Leitfaden 16/09/2021 Dieser Leitfaden ersetzt alle früheren Versionen.

## Was machen, wenn ...



- (1) Für Personen, die seit ≤ 5 Tagen Symptome von COVID-19 zeigen, wird ein **Antigen-Schnelltest** bevorzugt weil dieser Test schneller geht und das Ergebnis in diesem spezifischen Fall zuverlässiger ist.
- (2) Kontakt mit hohem Risiko (indikativ): im Allgemeinen längerer Kontakt von mehr als 15 Minuten und weniger als 1,5 m, und wenn mindestens eine der beiden Personen keine Maske oder ihre Maske nicht richtig trug, das heißt die Maske bedeckte nicht die Nase und den Mund. Die Kontakte des Mitbewohners werden automatisch als Hochrisikokontakte betrachtet.
- (3) Wenn der Test des Hochrisikokontaktes / Mitbewohners negativ ist, kann die Quarantäne aufgehoben werden.
- (4) Wenn man mit einer positiv getesteten Person zusammenwohnt und Isolierung nicht möglich ist (z.B. bei sehr kleinen Kindern) ist ein PCR-Test am 1. Tag und am 17. Tag notwendig. Der 2. Test wird tatsächlich frühestens 7 Tage nach dem letzten Risikokontakt abgenommen (= letzter Tag der Isolierung = T10). Das bedeutet, dass der 2. Test frühestens am 17. Tag nach Erscheinen der Symptome des Indexfalls (oder nach einem positiven Testergebnis) abgenommen wird;