



COVID-19

Leitfaden 11/01/2022 Dieser Leitfaden ersetzt alle früheren Versionen.

Was machen, wenn ...



SELBSTTEST: bei der Apotheke oder im Supermarkt zu kaufen, selbst auszuführen, für Hochrisikokontakte ab Tag 4 nach dem Kontakt.
Ein positiver Selbsttest muss immer von einem PCR-Test bestätigt werden.

SCHNELLTEST: in der Apotheke abnehmen lassen, und zwar wenn man Symptome hat, mit oder ohne vorab erhaltenem Code über meinegesundheit.belgien.be.

PCR-TEST: in einem Testzentrum abnehmen lassen, Ergebnis erst nach Stunden/Tagen.

HOCHRISIKOKONTAKT: längerer Kontakt, länger als 15 Minuten mit einem Abstand von weniger als 1.5 m und wobei die Maske nicht oder nicht korrekt getragen wurde. Nicht korrekt getragen, bedeutet, dass Mund und Nase nicht bedeckt wurden.

VOLLSTÄNDIG GEIMPFT: 3. Impfdosis ODER Basisimpfung in den letzten 5 Monaten und länger als 2 Wochen vorab.

KÜRZLICH INFIZIERT: in den letzten 5 Monaten infiziert, mit PCR-Test oder Schnelltest bestätigt.

TEILWEISE GEIMPFT: Basisimpfung seit > 5 Monate

NICHT GEIMPFT: keine Basisimpfung, oder Impfung seit weniger als 2 Wochen

BASISIMPFUNG: 1 Impfdosis Janssen COVID-19® oder 2 Impfdosen der anderen Impfstoffe auf dem Belgischen Markt